




ENTORSES	TENDINOPATHIES	GONARTHROSE
1 tissugel/24h	2 tissugels/24h	2 tissugels/24h
EXEMPLES DE LOCALISATIONS		
		

flector TISSUGEL®

Παρέχει την πιο αποτελεσματική, ασφαλή και άνετη τοπική θεραπεία των μυϊκών και αρθρικών φλεγμονωδών καταστάσεων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Flector EP Tissugel παρέχει μια αποτελεσματική και ασφαλή διαδερμική διείσδυση χωρίς συστηματικές παρενέργειες.

Για ανακούφιση από συμπτώματα ρευματικών πόνων, οσφυαλγίας, μυϊκών πόνων και πρηξιμάτων, όπως κακώσεις, διαστρέμματα και αθλητικοί τραυματισμοί.

Προκειμένου να διεισδύσει στα στρώματα ιστού που χωρίζουν το δέρμα από τον υποκείμενο ιστό-στόχο, το φάρμακο πρέπει να είναι σε θέση να διαλυθεί τόσο σε υδάτινα όσο και λιπιδικά περιβάλλοντα. Τα άλατα επολαμίνης δικλοφενάκης (IBSA δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), σε σύγκριση με την παραδοσιακή δικλοφενάκη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, έχουν αυξημένη διαλυτότητα και στα δύο διαμερίσματα.

Στο FLECTOR EP TISSUGEL το βασικό συστατικό του, η επολαμίνη δικλοφενάκη (Diclofenac Erolaminum), έχει ένα πολύ ουσιαστικό πλεονέκτημα, αποδεσμεύεται σταδιακά και διαρκώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής τροφοδότηση του ερεθισμένου σημείου και να επιφέρει ταχύτερη θεραπεία



flector TISSUGEL®


flector TISSUGEL®

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καψικών συσπάσεων μετά από χειρουργική επέμβαση προσθετικής στήθους.

Παρέχει αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία τραυματισμών όπως στραμπουλήγματα αρθρώσεων, θλάσεις και ρήξεις μυών και συνδέσμων.

Είναι πολύ δραστικό σε όλα τα στάδια της φλεγμονής και παρέχει ισχυρότατη αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση.



Η καψική σύσπαση αποτελεί την κύρια μετεγχειρητική επιπλοκή μετά την προσθετική μαστού με τοποθέτηση εμφυτεύματος. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία γνωστή συστηματική θεραπεία για βελτίωση που να μην θέτει ταυτόχρονα τον ασθενή σε κίνδυνο δευτερογενών επιπλοκών γενικότερης φύσεως. Το Flector Tissugel είναι το μοναδικό επιδερμικό αντιφλεγμονώδες με τοπική δράση. Η τοπική αντιφλεγμονώδης δράση διαρκείας σπανίως συνδέεται με παρενέργειες, που είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες θεραπείας, εμφανίζεται υψηλή συχνότητα αλλαγών από καψική σύσπαση Baker 2 ή 3 σε 1, εφόσον η εφαρμογή του ξεκίνησε το αργότερο τρεις μήνες από την έναρξη της καψικής σύσπασης.



Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά συγχρόνως την φλεγμονή και το οίδημα και καταπραΰνει τον πόνο.

Το Flector EP Tissugel® είναι ένα μοναδικό φαρμακευτικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Η δραστική ουσία του παρασκευάσματος είναι η δικλοφενάκη, η οποία, όταν χρησιμοποιείται εξωτερικά, διαπερνά μέσω του δέρματος τους υποδόριους ιστούς όπου αναπτύσσει αντιφλεγμονώδη δράση, περιορίζει την εμφάνιση οιδήματος και μειώνει τον πόνο.



Παρασκευάζεται στην Ελβετία

Αντιπρόσωπος για την Κύπρο
A CONSTANTINIDES PHARMACEUTICALS
T.K 50393 Λεμεσός
Τηλ. 25337056 Fax 25336637
www.aconstantinides.com

Το FLECTOR EP Tissugel είναι ένα παρασκεύασμα που προορίζεται για τοπική θεραπεία φλεγμονών των συνδέσμων, αρθρώσεων και μυών που προκαλούνται από τραυματισμούς όπως στραμπουλήγματα αρθρώσεων, θλάσεις και ρήξεις μυών και συνδέσμων.